



## 用藥指導- Acetaminophen

商品名：Paramol / Anti-Phen Syrup

中文名：普除痛錠 / 安佳熱糖漿

成分含量：500 毫克/顆；24 毫克/c.c · 60 c.c/瓶

作用：退燒 · 止痛

### 用法與劑量

#### 錠劑

- ⊗ 新生兒(大於 10 天)：10 ~ 15 毫克/每公斤/每天(每 4 ~ 6 小時投予)，每日最大極量為 90 毫克
- ⊗ 孩童：10 ~ 15 毫克/每公斤/每天(每 4 ~ 6 小時投予)，每日最大極量為 2600 毫克

#### 液劑

- ⊗ 12 歲以上：13 c.c
- ⊗ 6~12 歲：6.5 c.c
- ⊗ 3 ~ 6 歲：3 c.c
- ⊗ 3 歲以下之嬰幼兒，使用前請洽醫師
- ⊗ 體溫大於 38.5 °C 或需要時服用，若症狀持續，則可每 4 小時服一次，一日不可超過 5 次

### 醫師/藥師指示服藥方式

每天	早餐	中餐	晚餐	睡前	特別指示
用量					

### 藥品存放方式

- ⊗ 存放於密閉容器內，室溫下(15 ~ 30 °C)、乾燥處，避光貯存。
- ⊗ 注意避免放在孩童容易取得的地方。

continued

3 February 2017



eDucating the community by  
Sharing the expertise of the Medical Faculty

如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師：

蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨嗓音異常嘶啞；臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

#### 注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

- Ⓢ 如果孩子忘記（錯過）一次用藥，一旦想起請儘早讓小孩服用錯過的藥物。
- Ⓢ 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到的正常用藥時間。
- Ⓢ 避免同時服用 2 劑或額外劑量。
- Ⓢ 請勿將藥分給其他小孩吃。
- Ⓢ 看診時請隨身攜帶一份藥物的清單（處方藥、健康食品、維他命製劑、非處方藥）給醫師。
- Ⓢ 嚴格遵照醫師指示讓孩子按時定量服藥，在未徵詢醫師同意前，請勿擅自決定開始、停止服用任何藥物或變更藥物劑量。

#### 兒童用藥紀錄表

時間點	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
早上							
中午							
晚上							
睡前							

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

106.01 HE-CP001

中國醫藥大學兒童醫院

聯絡電話 (04) 22052121 分機 2128 / 2132

若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡