



## 用藥指導-胰島素(Insulin)

商品名	中文名	成分含量
Apidra SoloStar	愛胰達注射劑	Insulin glulisine 300IU/3mL
NovoRapid FlexPen	諾和瑞諾易筆	Insulin aspart FlexPen 300IU/3mL
Actrapid H.M.	愛速基因人體胰島素	Regular Insulin 1000IU/10mL
Insulatard	因速來達	Isophane.Mono Insulin 1000IU/10mL
NovoMix 30 FlexPen	諾和密斯 30 諾易筆	Aspart/Protamine 100IU/mL 3mL
Humalog Mix 50 KwikPen	優泌樂 - 混合型 50	Humalog Mix 100IU/mL 3mL/Pen
LANTUS solostar	蘭德仕注射筆	INSULIN Glargine 100IU/mL 3mL
Levemir FlexPen	瑞和密爾(諾易筆)	Insulin detemir 100IU/mL 3mL

### 用法與劑量

- ⊗ 皮下注射: 0.5 ~ 1 IU/公斤/天, 依據血糖值決定胰島素及劑量。
- ⊗ 施打前先把用具備齊(針具、酒精棉片)。把手洗乾淨、擦乾。
- ⊗ 筆針的蓋子打開, 轉刻度到施打的劑量單位。注射針頭帽移除, 先用酒精棉擦拭抽藥部位。瓶裝胰島素使用前輕搖倒立後依照劑量抽取。
- ⊗ 選擇沒有傷口的皮膚, 每次更換注射部位(需間隔 2 手指寬度)。
- ⊗ 注射部位用酒精棉擦拭, 以 90 度垂直且需要捏起皮膚。

### 醫師/藥師指示服藥方式

每天	早餐	中餐	晚餐	睡前	特別指示
用量					

3 February 2017



eDucating the community by sharing the expertise of the Medical Faculty

continued

### 藥品存放方式

- ⊗ 開封前冷藏(2 ~ 8 °C) , 開封後室溫(15 ~ 30 °C)貯存。
- ⊗ 注意避免放在孩童容易取得的地方。

如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師：

低血糖。

### 特別用藥指示

嚴格遵照醫師指示讓孩子按時施打胰島素。

- ⊗ 注射部位以腹部距肚臍 10 公分以上、上臂外上側、大腿前外側、及臀部外上 1/4，以不至於傷害到神經為原則。
- ⊗ 混合胰島素注射，必須先抽清的胰島素，才抽濁的胰島素。
- ⊗ 有皮下脂肪萎縮或腫塊應告即醫師或衛教師。

### 注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

- ⊗ 低血糖：頭暈、冒冷汗、饑餓感、手抖、視力模糊、頭痛等。
- ⊗ 高血糖：口渴口乾、多尿、噁心、嘔吐、皮膚乾紅、心跳快速、神智不清、呼吸深而快、呼氣有水果味等。
- ⊗ 未開封時須冷藏，不可冷凍。已開封則室溫下避光可保存 4 星期。

### 兒童用藥紀錄表

時間點	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
早上							
中午							
晚上							
睡前							

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

106.01 HE-CP006

中國醫藥大學兒童醫院

聯絡電話 (04) 22052121 分機 3154 / 5126

若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡