



用藥指導- Sulfamethoxazole & Trimethoprim

商品名：Sulfacotrim susp

中文名：沙法克寧懸浮液劑(複方)

成分含量：Sulfamethoxazole 40 毫克/Trimethoprim 8 毫克/c.c ·
60 c.c/瓶

作用：呼吸道、胃腸道及尿道感染

用法與劑量

液劑

- ⊗ 6 週 ~ 5 個月，每日二次，每次 2.5 c.c
- ⊗ 6 個月 ~ 5 歲，每日二次，每次 5 c.c
- ⊗ 6 歲 ~ 12 歲，每日二次，每次 10 c.c

醫師/藥師指示服藥方式

每天	早餐	中餐	晚餐	睡前	特別指示
用量					

藥品存放方式

- ⊗ 存放於密閉容器內，室溫下(15 ~ 30 °C)、乾燥處，避光貯存。
- ⊗ 注意避免放在孩童容易取得的地方。
- ⊗ 服用前請先振盪均勻。

如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師：

蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨噁心、嘔吐、腹瀉、呼吸急促、肌肉疼痛等。

continued

3 February 2017



eDucating the community by
sHaring the expertise of the Medical Faculty

注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

- Ⓢ 如果孩子忘記（錯過）一次用藥，一旦想起請儘早讓小孩服用錯過的藥物。
- Ⓢ 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
- Ⓢ 避免同時服用 2 劑或額外劑量。
- Ⓢ 請勿將藥分給其他小孩吃。
- Ⓢ 看診時請隨身攜帶一份藥物的清單（處方藥、健康食品、維他命製劑、非處方藥）給醫師。
- Ⓢ 嚴格遵照醫師指示讓孩子按時定量服藥，在未徵詢醫師同意前，請勿擅自決定開始、停止服用任何藥物或變更藥物劑量。

兒童用藥紀錄表

時間點	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
早上							
中午							
晚上							
睡前							

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

106.01 HE-CP008

中國醫藥大學兒童醫院

聯絡電話 (04) 22052121 分機 3154 / 5126

若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡