



用藥指導- Theophylline

商品名：Thoin S.R.M.C / Ventol liq.
 中文名：喘克緩釋微粒膠囊/舒喘內服液
 成分含量：125 毫克/顆；5.34 毫克/c.c · 60 c.c/瓶
 作用：氣喘及支氣管痙攣

用法與劑量

膠囊

- ⊙ 13 ~ 16 歲孩童：每 12 小時一次，每次 250 毫克
- ⊙ 9 ~ 12 歲孩童：每 12 小時一次，每次 125 ~ 250 毫克

液劑：一次劑量 125 ~ 250 毫克，每 6 小時給藥一次

- ⊙ 9 ~ 16 歲：每天一次，每次 12 毫克/公斤
- ⊙ 1 ~ 9 歲：天一次，每次 6 毫克/公斤
- ⊙ 未滿 1 歲：每天一次，每次 2 ~ 3 毫克/公斤

醫師/藥師指示服藥方式

每天	早餐	中餐	晚餐	睡前	特別指示
用量					

藥品存放方式

- ⊙ 存放於密閉容器內，室溫下(15 ~ 30 ℃)、乾燥處，避光貯存。
- ⊙ 注意避免放在孩童容易取得的地方。

3 February 2017



eDucating the community by
 sHaring the expertise of the Medical Faculty

continued

如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師：

蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨心悸、顏面潮紅、呼吸急促、胃部不適、頭痛等。

注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

- Ⓢ 如果孩子忘記（錯過）一次用藥，一旦想起請儘早讓小孩服用錯過的藥物。
- Ⓢ 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到的正常用藥時間。
- Ⓢ 避免同時服用 2 劑或額外劑量或與葡萄柚（汁）併服。
- Ⓢ 請勿將藥分給其他小孩吃。
- Ⓢ 看診時請隨身攜帶一份藥物的清單（處方藥、健康食品、維他命製劑、非處方藥）給醫師。
- Ⓢ 嚴格遵照醫師指示讓孩子按時定量服藥，在未徵詢醫師同意前，請勿擅自決定開始、停止服用任何藥物或變更藥物劑量。

兒童用藥紀錄表

時間點	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
早上							
中午							
晚上							
睡前							

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

106.01 HE-CP009

中國醫藥大學兒童醫院

聯絡電話 (04) 22052121 分機 3154 / 5126

若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡