



用藥指導- Zithromax

商品名：Azithromycin suspension

中文名：日舒懸液用粉

成分含量：40 毫克/c.c · 15 c.c/瓶

作用：感染症

用法與劑量

☞ 每天一次，每次 10 毫克/公斤，連續服用 3 天。

醫師/藥師指示服藥方式

每天	早餐	中餐	晚餐	睡前	特別指示
用量					

藥品存放方式

- ☞ 乾粉製劑應放於密閉容器內，室溫下(15 ~30 °C)，避光貯存；配製後懸浮液於室溫下可保存 5 天。
- ☞ 注意避免放在孩童容易取得的地方。
- ☞ 使用前請先依配製方式來配製，懸浮液服用前請先振盪均勻。
- ☞ 附有防兒童開啟的瓶蓋及適當的混合器。

如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師：

蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛等。

continued

3 February 2017



eDucating the community by
sHaring the expertise of the Medical Faculty

注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

- ⊗ 如果孩子忘記（錯過）一次用藥，一旦想起請儘早讓小孩服用錯過的藥物。
- ⊗ 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
- ⊗ 避免同時服用 2 劑或額外劑量。
- ⊗ 請勿將藥分給其他小孩吃。
- ⊗ 看診時請隨身攜帶一份藥物的清單（處方藥、健康食品、維他命製劑、非處方藥）給醫師。
- ⊗ 嚴格遵照醫師指示讓孩子按時定量服藥，在未徵詢醫師同意前，請勿擅自決定開始、停止服用任何藥物或變更藥物劑量。

兒童用藥紀錄表

時間點	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
早上							
中午							
晚上							
睡前							

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

106.01 HE-CP010

中國醫藥大學兒童醫院

聯絡電話 (04) 22052121 分機 3154 / 5126

若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡